

Инструкция
по медицинскому применению
лекарственного препарата

Вазоспонин

наименование лекарственного препарата (Vasosponinum)

Регистрационный номер: ЛП-000793

Торговое наименование: Вазоспонин

**Международное непатентованное
или группировочное наименование:**
Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активный компонент

Полиспонин – 0,10 г
(Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт)
экстракт сухой с содержанием суммы фураностаноловых агликонов в пересчете на диосгенин и абсолютно сухое вещество 1,0 %

Вспомогательные вещества

Сахар молочный (лактозы моногидрат) – 0,017 г
Крахмал картофельный – 0,013 г
Магния оксид – 0,007 г
Кальция стеарат – 0,003 г
Масса таблетки – 0,14 г

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Гиполипидемическое средство растительного происхождения.

Код АТХ

[C10AX].

Фармакологическое действие

Снижает уровень холестерина, повышает содержание фосфолипидов в крови и снижает коэффициент холестерин / фосфолипиды; снижает артериальное давление.

Показания к применению

Гиперхолестеринемия (легкая и умеренная).
Атеросклероз сосудов головного мозга как в начальных его стадиях (в целях профилактики), так и при выраженных формах заболевания; при атеросклерозе сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

С осторожностью

Артериальная гипотония.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1–2 таблетки 2–3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20–30 дней с 7–10-дневными перерывами. Курс лечения 3–4 месяца.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожный зуд), снижение аппетита, повышенное потоотделение. *Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не установлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Таблетки 100 мг. По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 2, 3, 5 или 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 30 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия
Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ. Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.
Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.